



SANIDAD ■ CURSO

Alrededor de un 30% de las mujeres mayores de 50 años puede sufrir incontinencia urinaria

■ Es una de las principales patologías de lesiones en el suelo pélvico

A.S.

Alrededor de un 30% de las mujeres mayores de 50 años puede sufrir incontinencia urinaria, que es una de las principales consecuencias de tener lesiones en el suelo pélvico, según explicó a este diario Fernando Lorenzo, urólogo del Complejo Asistencial de Salamanca y directora del curso de suelo pelviano de la Universidad de Salamanca que

se está celebrando en la Hospedería Fonseca.

No obstante, la especialista salmantina dejó claro ayer que el abordaje de estas patologías relacionadas con lesiones en el suelo pélvico deben hacerse desde un punto de vista multidisciplinar, donde participen especialistas de Urología, Ginecología, Coloproctología, Digestivo, Rehabilitación y Anestesiología.

Este curso, el primero organizado por una universidad española, abordó ayer aspectos determinantes de esta zona del cuerpo como embarazos y partos, cirugía del prollapso pelviano e incontinencia urinaria masculina, entre otros.

La cita finaliza en la jornada matinal de hoy donde se debatirán el resto de los 20 puntos claves del programa científico.



Asistentes el curso de suelo pelviano organizado por Fernanda Lorenzo./GUZÓN